

Quelle : Universität Düsseldorf/AWMF

AWMF online



Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen
Medizinischen
Fachgesellschaften

Den Link zu diesen Informationen finden Sie auf unserer Web-Seite : www.antinass.ch

AWMF-Leitlinie (F98.0)

Enuresis und funktionelle Harninkontinenz

***Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie***

AWMF-Leitlinien-Register	Nr. 028/026	Entwicklungsstufe:	1
---------------------------------	--------------------	---------------------------	----------

Zitierbare

Quelle:

Dt.Ges.f. Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie u.a. (Hrsg.): Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von psychischen Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter. Deutscher Ärzte Verlag, 2. überarbeitete Auflage 2003 - ISBN: 3-7691-0421-8

Enuresis und funktionelle Harninkontinenz (F98.0)

Die apparative Verhaltenstherapie (AVT) ist unbestritten das Mittel der ersten Wahl bei der Therapie der Enuresis nocturna (I). Tragbare Geräte (sog. "Klingelhose") und Bettgeräte (sog. "Klingelmatte") sind etwa gleich effektiv - die Auswahl sollte den Kindern überlassen werden.
